(51) МПК
C07J 63/00 (2006.01)
A61K 31/56 (2006.01)
A61K 31/58 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
 ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(52) СПК

C07J 63/00 (2022.08); *A61K 31/56* (2022.08); *A61K 31/58* (2022.08); *A61P 35/00* (2022.08)

(21)(22) Заявка: 2020107440, 18.02.2020

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
18.02.2020

Дата регистрации:
19.12.2022

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 18.02.2020

(43) Дата публикации заявки: 18.08.2021 Бюл. № 23

(45) Опубликовано: 19.12.2022 Бюл. № 35

Адрес для переписки:

450075, Рес. Башкортостан, г. Уфа, пр-кт
 Октября, 141, ИНСТИТУТ НЕФТЕХИМИИ
 И КАТАЛИЗА УФИЦ РАН

(72) Автор(ы):

Спивак Анна Юльевна (RU),
 Недопёкина Дарья Александровна (RU),
 Давлетшин Эльдар Валерьевич (RU),
 Джемилева Лиля Усеиновна (RU),
 Дьяконов Владимир Анатольевич (RU),
 Джемилев Усеин Меметович (RU)

(73) Патентообладатель(и):

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
 БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ
 УЧРЕЖДЕНИЕ УФИМСКИЙ
 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
 РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (RU)

(56) Список документов, цитированных в отчете
 о поиске: А. Yu. Spivak "C-28 esters of
 triterpenoid acids bearing
 tris(hydroxymethyl)aminomethane: Synthesis,
 anticancer and antimicrobial activity"
 Proceedings, 41(1), V. 45, 2019. V.R. Fantin. M.J.
 Berardi, L. Scorrano, S.J. Korsmeyer, P. Leder.
 "A novel mitochondriotoxic small molecule that
 selectively inhibits tumor cell growth" Cancer
 cell, 2002, (см. прод.)

(54) КОНЬЮГАТЫ ТРИТЕРПЕНОВЫХ КИСЛОТ И (Е)-4-(1Н-ИНДОЛ-3-ИЛВИНИЛ)-ПИРИДИНИЙ БРОМИДА С ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ АКТИВНОСТЬЮ

(57) Реферат:

Изобретение относится к области биоорганической и медицинской химии новых биологически активных производных бетулина, бетулиновой, урсоловой и олеаноловой кислот, в частности изобретение относится к конъюгатам тритерпеновых кислот с (Е)-4-(1Н-индол-3-илвинил)-пиридиний бромидом формулы 1-8, которые проявили *in vitro* значительное цитотоксическое действие в низких микромолярных концентрациях на опухолевых клеточных линиях человека U937 (моноцитарная

лейкемия), K562 (хронический миелоидный лейкоз) и Jurkat (Т-лимфобластная лейкемия). 2 н.п. ф-лы, 1 табл., 8 пр.

(56) (продолжение):

2(1), 29-42. R. Fantin. P. Leder. "F16, a Mitochondriotoxic Compound, Triggers Apoptosis or Necrosis Depending on the Genetic Background of the Target Carcinoma Cell" Cancer Research. 2004, 64, 329-336. RU 2551647 C2, 27.05.2015.

R U
2 7 8 6 1 3 4
C 2

R U
2 7 8 6 1 3 4
C 2

FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY

(51) Int. Cl.
C07J 63/00 (2006.01)
A61K 31/56 (2006.01)
A61K 31/58 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)

(12) ABSTRACT OF INVENTION

(52) CPC

C07J 63/00 (2022.08); A61K 31/56 (2022.08); A61K 31/58 (2022.08); A61P 35/00 (2022.08)(21)(22) Application: **2020107440, 18.02.2020**(24) Effective date for property rights:
18.02.2020Registration date:
19.12.2022

Priority:

(22) Date of filing: **18.02.2020**(43) Application published: **18.08.2021 Bull. № 23**(45) Date of publication: **19.12.2022 Bull. № 35**

Mail address:

**450075, Res. Bashkortostan, g. Ufa, pr-kt
Oktyabrya, 141, INSTITUT NEFTEKHIMII I
KATALIZA UFITS RAN**

(72) Inventor(s):

**Spivak Anna Yulevna (RU),
Nedopekina Darya Aleksandrovna (RU),
Davletshin Eldar Valerevich (RU),
Dzhemileva Lilya Useinovna (RU),
Dyakonov Vladimir Anatolevich (RU),
Dzhemilev Usein Memetovich (RU)**

(73) Proprietor(s):

**FEDERALNOE GOSUDARSTVENNOE
BYUDZHETNOE NAUCHNOE
UCHREZHDENIE UFIMSKIY FEDERALNYI
ISSLEDOVATELSKIY TSENTR ROSSIJSKOY
AKADEMII NAUK (RU)**

(54) CONJUGATES OF TRITERPENE ACIDS AND (E)-4-(1H-INDOLE-3-YLVINYL)-PYRIDINIUM BROMIDE WITH ANTITUMOR ACTIVITY

(57) Abstract:

FIELD: bioorganic and medical chemistry.

SUBSTANCE: invention relates to the field of bioorganic and medical chemistry of new biologically active derivatives of betulin, betulinic, ursolic, and oleanolic acids, in particular, the invention relates to conjugates of triterpene acids with (E)-4-(1H-indole-3-ylvinyl)-pyridinium bromide of the formula 1-8, which have shown a significant cytotoxic effect in vitro, at low micromolar concentrations, on human tumor cell lines U937 (monocytic leukemia), K562 (chronic myeloid leukemia), and Jurkat (T-lymphoblastic leukemia).

EFFECT: obtaining of new conjugates for the treatment of cancer.

cl, 1 tbl, 8 ex

RU 2 786 134 C2

2

Изобретение относится к области биоорганической и медицинской химии новых биологически активных производных бетулина, бетулиновой, урсоловой и олеаноловой кислот, в частности изобретение относится к синтезу новых химических соединений формулы 1-8, которые проявили *in vitro* значительное цитотоксическое действие в низких микромолярных концентрациях на опухолевых клеточных линиях человека U937 (моноцитарная лейкемия), K562 (хронический миелоидный лейкоз) и Jurkat (Т-лимфобластная лейкемия):

Соединения формулы 1-8 представляют собой новые С-28 эфирные производные бетулина, бетулиновой, урсоловой и олеаноловой кислот:

35

40

45

в которых молекулы тритерпеноида при С-28 позиции ковалентно связаны бутановым или триэтиленгликолевым мостиками с митохондриально направленным липофильным катионным фрагментом, представляющим собой (Е)-4-(1Н-индол-3-илвинил)-пиридилий бромид. Соединение (Е)-4-(1Н-индол-3-илвинил)-пиридилий бромид - близкий структурный аналог делокализованного липофильного катионного соединения (Е)-4-(1Н-индол-3-илвинил)-N-метилпиридилий йодида, известного в литературе как соединение F-16 [V.R. Fantin, M.J. Berardi. L. Scorrano. S.J. Korsmeyer. P. Leder. Cancer cell. 2002. 2(1). 29-42; V.R. Fantin. P. Leder. Cancer Research. 2004, 64, 329-336]:

Нативные пентациклические тритерпеновые кислоты лупанового, урсанового, олеананового ряда и их синтетические производные составляют важный класс

биологически активных веществ с широким спектром биологического и фармакологического действия. Особый интерес к пентациклическим тритерпеноидам вызван их противоопухолевыми свойствами, которые удачно сочетаются с низкой системной токсичностью по отношению к животным. Так, для бетулиновой кислоты выявлено *in vitro* цитотоксическое действие против меланомы (ED50 0.5-4.8 мкг/мл), аденокарциномы, нейробластомы (ED50 2-10 мкг/мл), медуллобластомы (ED50 3-15 мкг/мл), и глиобластомы (ED50 5-16 мкг/мл) [X. Zhang, J. Hu, Y. Chen. *Molecular Medicine Reports*. 2016, 14(5), 4489-4495; P. Yogeeswari, D. Sriram. *Current Medicinal Chemistry*, 2005, 12, 657-666], противораковая активность показана также *in vivo* на моделях ксенографтах [A.A. Damle, Y.P. Pawar, A.A. Narkar. *Indian Journal of Experimental Biology*, 2013, 51, 485-491]. В отношении нормальных клеток человека (меланоциты или фибробласты кожи) бетулиновая кислота неактивна, что свидетельствует об избирательном антинеопластическом эффекте этого соединения [F.B. Mullauer, L. Bloois, J.B. Daalhuisen, M.S.T. Brink, G. Storm, J.P. Medema, R.M. Schiffelers, J.H. Kessler. *Anticancer Drugs*, 2011, 22, 223-233]. Пентациклические тритерпеновые кислоты относятся к группе противораковых веществ, биологической мишенью которых являются митохондрии. Эти соединения дестабилизируют митохондрии и индуцируют апоптоз раковых клеток, не затрагивая нормальные клетки. В работах, посвященных изучению механизма противоопухолевого действия природных тритерпеновых кислот, убедительно показано, что эти растительные вторичные метаболиты способствуют накоплению в митохондриях активных кислородсодержащих частиц. Продуцирование в больших концентрациях свободных радикалов ведет к увеличению проницаемости или к разрыву мембран митохондрий с последующим высвобождением в цитозоль проапоптотного медиатора - цитохрома с, активацией каспаз и фрагментацией ДНК [S. Fulda. *International Journal of Molecular Sciences*. 2008, 9, 1096-1107; S. Fulda, G. Kroemer. *Drug Discovery Today*. 2009, 14, 885-890; F.B. Mullauer, J.H. Kessler, J.P. Medema. *Anticancer Drugs*. 2010. 21, 215-227]. Вместе с тем, относительно низкий потенциал биологического действия и высокая гидрофобность тритерпеновых кислот являются серьезным препятствием для продвижения этих соединений в клиническую практику.

В настоящее время для создания новых митохондриально-нацеленных противоопухолевых лекарственных средств активно исследуются конъюгаты цитотоксических соединений с делокализованными липофильными катионными молекулами с малым молекулярным весом, которые могут проходить через липидный бислой клеточных мембран и аккумулироваться внутри митохондрий в более высокой концентрации, чем в цитоплазме. К известным делокализованным липофильным катионам, проникающим через гидрофобные барьеры плазмы и митохондриальные мембраны, относятся Родамин-123, родацианин МКТ-077, катионы деквалиния и трифенилфосфония [P.G. Finichiu, A.M. James, L. Larsen, R.A. Smith, M.P. Murphy. *Journal of Bioenergetics and Biomembranes*, 2013, 45, 165-173; R.A. Smith, R.C. Hartley, H.M. Cochemé, M.P. Murphy, *Mitochondrial pharmacology. Trends in Pharmacological Sciences*, 2012. 33(6). 341-352; D. Pathania, M. Millard, N. Neamati. *Advanced Drug Delivery Reviews*, 2009. 61(14). 1250-1275]:

TPP

DQA

Rhodamine

123

MKT-077

Эти катионные малые молекулы могут играть роль средств доставки цитотоксических соединений в митохондрии опухолевых клеток. Так, трифенилфосфониевый фрагмент (TPP⁺) был успешно использован в синтезе противораковых митохондриально-нацеленных производных бетулина, [O.V. Tsepaeva, A.V. Nemtarev, T.I. Abdullin, L.R. Grigor'eva, E.V. Kuznetsova, R.A. Akhmadishina, L.E. Ziganshina, H.H. Cong, V.F. Mironov. Journal of Natural Products, 2017, 80(8), 2232-2239], бетулиновой кислоты [Darya A. Nedopekina, Rinat R. Gubaidullin, Victor N. Odinov, Polina V. Maximchik, Boris Zhivotovsky, Yuriy P. Bel'skii, Veniamin A. Khazanov, Arina V. Manuylova, Vladimir Gogvadze, and Anna Yu. Spivak, MedChemComm, 2017, 8, 1934], стевиола [I.Y. Strobykina, M.G. Belenok, M.N. Semenova, V.V. Semenov, V.M. Babaev, I.Kh. Rizvanov, V.F. Mironov, V.E. Kataev. Journal of Natural Products. 2015, 78(6), 1300-1308] и куркумина [C.A. Reddy, V. Somepalli, T. Golakoti, A.K. Kanugula, S. Karnewar, K. Rajendiran, N. Vasagiri, S. Prabhakar, P. Kuppusamy, S. Kotamraju, V.K. Kutala. PLoS One, 2014, 9(3), e89351]. В первой фазе клинической триады находится делокализованный липофильный катион родацианин MKT-077 [C.D. Britten, E.K. Rowinsky, S.D. Baker, G.R. Weiss, L. Smith, J. Stephenson, M. Rothenberg, L. Smetzer, J. Cramer, W. Collins, D.D. Von Hoff, S.G. Eckhardt. Cancer Research. 2000, 6, 42-49]. В ряду липофильных делокализованных катионных соединений известна также малая митохондриально-токсичная молекула (E)-4-(1H-индол-3-илвинил)-N-метилпиридиний иодид (F-16). Соединение F-16 было открыто в 2002 году в результате скрининга приблизительно 16000 митохондриально-тропных молекул [V.R. Fantin, M.J. Berardi, L. Scorrano, S.J. Korsmeyer, P. Leder. Cancer cell, 2002, 2(1), 29-42; V.R. Fantin, P. Leder. Cancer Research, 2004, 64, 329-336]:

F-16

F-16a

F-16 селективно аккумулируется в митохондриальном матриксе за счет высокого отрицательного трансмембранного потенциала митохондрий и индуцирует апоптотическую смерть клеток опухолевых клеточных линий разного типа. Аккумуляция F-16 в матриксе митохондрий приводит к деполяризации трансмембранного потенциала

митохондрий, открытию канала митохондриальной поры с потерей митохондриальной структурной целостности, реализации цитохрома с и аресту клеточного цикла. Обработка раковых клеток F-16 сопровождается значительным снижением внутриклеточного уровня АТФ и последовательным энергетическим распадом. Вместе с тем в качестве средства адресной доставки цитотоксических веществ в митохондрии раковых клеток молекула F-16 исследована в очень ограниченном числе работ. Описано ковалентное связывание нейтрального предшественника F-16 - (E)-4-(1H-индол-3-илвинил)-пиридина F-16a с производными известного противоракового средства 5-фторурацила через различные бромзамещенные спейсеры. Некоторые из синтезированных конъюгатов проявили меньшую в сравнении с 5-фторурацилом антипролиферативную активность в отношении неопухолевой клеточной линии [J. Wang, X.-Y. Fan, L.-Yu. Yang, H. He, R. Huang, F.-L. Jiang, Y. Liu. *Med. Chem. Commun*, 2016, 7, 2016-2019; C. Xiang, D.-W. Li, Z.-D. Qi, F.-L. Jiang, Y.-S. Gea, Y. Liu. *Luminescence*, 2013, 28, 865-872; J. Xu, H. He, L.-J. Zhou, Y.-Z. Liu, D.-W. Li, F.-L. Jiang, Yi Liu. *European Journal of Medicinal Chemistry*. 2018, 154, 305-313]:

Синергетический эффект противоракового действия был достигнут при ковалентном связывании через амидную функцию аминокислотного производного F-16 с хлорамбуцилом - известным ДНК-алкилирующим противораковым лекарством. Биологическое исследование показало, что полученный конъюгат представляет собой мульти-митохондриально действующий противораковый агент, который селективно убивает раковые клетки и преодолевает лекарственную резистентность [Y.B. Peng, Z.L. Zhao, T. Liu, G.J. Xie, C.Jin, T.G. Deng, Y. Sun, X. Li, X.X. Hu, X.B. Zhang, M. Ye, W.H. Tan, *ChemMedChem*. 2017, 12(3), 250-256]:

Таким образом делокализованная липофильная молекула F-16 и ее близкие структурные аналоги являются перспективным средством адресной доставки противоопухолевых соединений в митохондрии опухолевых клеток. Вместе с тем о синтезе конъюгатов тритерпеновых кислот с F-16 и изучении их цитотоксического

действия в отношении опухолевых клеточных линий в литературе не сообщалось.

Задачей предлагаемого изобретения является синтез новых конъюгатов бетулиновой, урсоловой и олеаноловой кислот с (Е)-4-(1Н-индол-3-илвинил)-пиридиний бромидом формулы 1-8, обладающих противоопухолевой активностью, которые могут быть использованы в качестве новых таргетных митохондриально-нацеленных противораковых лекарственных средств. Делокализованный катионный фрагмент (Е)-4-(1Н-индол-3-илвинил)-пиридиний бромид является близким структурным аналогом липофильного катиона (Е)-4-(1Н-индол-3-илвинил)-N-метилпиридиний йодида (F16).

Поставленная задача достигается новыми химическими соединениями формулы 1-8, представляющими собой конъюгаты (Е)-4-(1Н-индол-3-илвинил)-пиридиний бромида с С-28 эфирными производными бетулиновой кислоты, урсоловой кислоты и олеаноловой кислоты, путем конъюгации (Е)-4-(1Н-индол-3-илвинил)-пиридина F-16а и эфирных производных бетулиновой, урсоловой и олеаноловой кислот, содержащих С-28 бромбутановую или бромтриэтиленгликолевую боковые цепи 9-16, проявляющих *in vitro* цитотоксическое действие на опухолевые клеточные линии U937 (моноцитарная лейкоemia), K562 (хронический миелоидный лейкоз) и Jurkat (Т-лимфобластная лейкоemia).

Заявленные соединения 1-8 синтезировали из бромидов 9-16, которые получали следующим образом. Бромид 9 получали взаимодействием бетулина с 5-бромвалериановой кислотой в сухом хлористом метиле, с использованием дициклогексилкарбодиимида (DCC) и 4-диметиламинопиридина (DMAP) по методу [O.V. Tsepaeva, A.V. Nemtarev, T.I. Abdullin, L.R. Grigor'eva, E.V. Kuznetsova, R.A. Akhmadishina, L.E. Ziganshina, H.H. Cong, V.F. Mironov. *Journal of Natural Products*. 2017, 80(8), 2232-2239]:

Бромид 10 получали взаимодействием бетулиновой кислоты с трехкратным мольным избытком дибромида триэтиленгликоля в диметилформамиде (DMFA) с добавлением поташа в течение 3 часов при 50°C по методу [D.A. Nedopekina. R.R. Gubaidullin. V.N. Odinokov, P.V. Maximchik, B. Zhivotovsky, Y.P. Bel'skii, V.A. Khazanov, A.V. Manuylova, V. Gogvadze, A.Yu. Spivak. *Med. Chem. Commun.*, 2017. 8(10). 1934-1945]:

Бромиды 11, 12 и 13 получали взаимодействием бетулиновой кислоты, урсоловой кислоты и олеаноловой кислоты с четырехкратным мольным избытком 1,4-

дибромбутана в смеси растворителей ДМФА:CH₃CN=3:1 с добавлением поташа в течение 3 часов при 50°C как описано в работе [D.A. Nedopekina, R.R. Gubaidullin, V.N. Odinov, P.V. Maximchik, B. Zhivotovsky, Y.P. Bel'skii, V.A. Khazanov, A.V. Manuylova, V. Gogvadze, A.Yu. Spivak. Med. Chem. Commun., 2017, 8(10), 1934-1945] (схема 3).

5

20 Для получения бромидов 14, 15 и 16 бетулиновую кислоту, урсоловую кислоту и олеаноловую кислоту ацетилировали с помощью AcCl в ТГФ в присутствии пиридина и 4-диметиламинопиридина (DMAP). Полученные ацетаты трансформировали в соответствующие бромиды 14, 15 и 16 взаимодействием с четырехкратным мольным избытком 1,4-дибромбутана в смеси растворителей ДМФА:CH₃CN=3:1 с добавлением

25

45 (Е)-4-(1H-индол-3-илвинил)-пиридин получали реакцией грамина с пиридин-4-карбальдегидом с использованием три-п-бутилфосфина в CH₃CN при 81°C в атмосфере аргона в течение 24 часов как описано в работе [H. He, D.-W. Li, L.-Yu. Yang, L. Fu, X.-J. Zhu, W.-K. Wong, F.-L. Jiang, Y. Liu. Scientific Reports, 2015, 5, 13543]:

10 Целевые соединения 1-8 в которых тритерпеновое ядро связано с катионным фрагментом через бутаный или триэтиленгликолевый мостики получали взаимодействием бромидов 9-16 с (E)-4-(1H-индол-3-илвинил)-пиридином (F-16a) при кипячении в CH₃CN или в ДМФА при 85°С в атмосфере аргона в течение 12 часов с последующей очисткой соединений методом колоночной хроматографии на SiO₂:

45 В качестве исходных соединений использовали коммерчески доступные бетулин, урсоловую кислоту и олеаноловую кислоту. Бетулоновую кислоту получали окислением бетулина под действием реагента Джонса в ацетоне. Бетулиновую кислоту в виде смеси 3α и 3β-эпимеров (3α:3β=5:95) получали восстановлением бетулоновой кислоты NaBH₄ в смеси растворителей CHCl₃:MeOH=1:1. Кристаллизация смеси продуктов из MeOH

дала индивидуальный 3 β -эпимер [D.S.H.L. Kim, Z. Chen, T. Nguyen, J.M. Pezzuto, S. Qiu. Z.-Z. Lu. Synthetic Communications. 1997,27, 1607-1612].

Полученные конъюгаты 1-8, бетулиновая кислота (ВК) и соединение F-16 (образцы сравнения), а также механическая эквимольная смесь бетулиновой кислоты и F-16 (1: 1, мол/мол) были испытаны *in vitro* на опухолевых клеточных линиях U937, K562, и Jurkat с использованием МТТ-теста. Все полученные конъюгаты проявили цитотоксическую активность в низких микромолярных концентрациях в отношении исследуемых клеточных линий и значительно ($\approx$ в 100-200 раз) превосходили по противоопухолевой активности бетулиновую кислоту (табл. 1).

Таблица 1. Цитотоксическое действие веществ на опухолевые клеточные линии U937, Jurkat и K562 ($X \pm SE$)^b

Соединение	IC ₅₀ (μ M) ^a		
	U937	Jurkat	K562
1	0.906 $\pm$ 0.037 ^b	0.937 $\pm$ 0.032 ^b	0.904 $\pm$ 0.033 ^b
2	0.573 $\pm$ 0.024 ^b	1.26 $\pm$ 0.042 ^b	1.21 $\pm$ 0.041 ^b
3	0.616 $\pm$ 0.028 ^b	0.844 $\pm$ 0.034 ^b	0.812 $\pm$ 0.032 ^b
4	2.167 $\pm$ 0.073 ^b	0.584 $\pm$ 0.027 ^b	0.559 $\pm$ 0.025 ^b
5	2.461 $\pm$ 0.085 ^b	0.623 $\pm$ 0.031 ^b	0.588 $\pm$ 0.032 ^b
6	2.228 $\pm$ 0.076 ^b	0.561 $\pm$ 0.029 ^b	0.554 $\pm$ 0.028 ^b
7	0.607 $\pm$ 0.027 ^b	0.687 $\pm$ 0.034 ^b	0.671 $\pm$ 0.035 ^b
8	2.234 $\pm$ 0.081 ^b	0.578 $\pm$ 0.027 ^b	0.516 $\pm$ 0.029 ^b
F-16	>500 ^b	>500 ^b	>500 ^b
ВК	149.29 $\pm$ 4.17 ^b	81.68 $\pm$ 1.82 ^b	78.54 $\pm$ 1.76 ^b
F-16:ВК/1:1	122.17 $\pm$ 3.46 ^b	91.58 $\pm$ 1.95 ^b	89.15 $\pm$ 1.89 ^b

^a IC₅₀ (μ M) - концентрация, вызывающая полумаксимальную ингибицию жизнеспособных клеток.

^b X-среднее значение экспериментальных данных, SE-стандартная ошибка. Каждый IC₅₀ ($X \pm SE$) был получен из трех экспериментов в двух экземплярах.

Структура тритерпенового скелета (лупановый, урсановый, олеанановый) и тип линкера заметно не влияли на цитотоксическую активность.

Так, цитотоксическое действие соединений 1, 2 и 3 на клетки U-937 составило величину IC₅₀ соответственно 0.90, 0.57 и 0.62 μ M. Производные бетулиновой кислоты 3 и 4, урсоловой кислоты 5 и 6 или олеаноловой кислоты 7 и 8 проявили противоопухолевую активность в отношении клеточной линии Jurkat с величиной IC₅₀ в интервале 0.57 - 0.84 μ M. В исследуемых условиях соединение F-16 не проявило цитотоксического действия, а бетулиновая кислота показала противоопухолевую активность с величиной IC₅₀ 149 (U-937), 81.7 (Jurkat) и 78.5 (K562) μ M. В отличие от ковалентного связывания бетулиновой кислоты с молекулой F-16, механическая смесь этих соединений не показала заметного увеличения цитотоксической активности.

Преимущества предлагаемого способа:

1. Конъюгаты бетулиновой, урсоловой и олеаноловой кислот с (Е)-4-(1Н-индол-3-илвинил)-пиридиний бромидом эффективны в качестве противоопухолевых митохондриально-направленных лекарственных агентов. Делокализованный липофильный катионный фрагмент в соединениях 1-8 использован как вектор избирательной доставки тритерпеновых кислот в митохондрии опухолевых клеток.
2. При первичном биологическом тестировании конъюгатов 1-8, проведенном на трех видах опухолевых линий человека, все соединения независимо от структуры тритерпенового ядра существенно превосходили по противоопухолевой активности образцы сравнения - бетулиновую кислоту и соединение F16.

3. Ковалентное связывание двух цитотоксических соединений (бетулиновой кислоты и F16) привело к значительному синергетическому эффекту в отличие от использования этих соединений в виде механической смеси.

4. Целевые соединения 1-8 получены в 2-4 стадии из доступного растительного сырья бетулина или коммерчески доступных урсоловой и олеаноловой кислот с использованием простых и дешевых реагентов. Простой в препаративном выполнении синтез позволяет получать целевые соединения в любых количества, необходимых для научных и медицинских исследований.

Изобретение поясняется примерами.

10 Синтез солей 1-8 (общая методика). Смесь соответствующего бромида и 3-[2-(4-пиридил)винил]индола перемешивают в ацетонитриле при кипячении или в диметилформамиде при 85°C в атмосфере аргона в течение 12 часов. Затем смесь охлаждают до комнатной температуры, растворитель упаривают при пониженном давлении и сухой остаток хроматографируют на колонке с SiO₂ [хлороформ/метанол 15 (30:1→10:1)] с получением соединений 1-8 (81-89%).

Пример 1. N-{5-(3β-гидроксиуп-20(29)-ен-28-ил-окси)-5-оксопентил}-(E)-4-(1H-индол-3-илвинил)пиридиний бромид (1):

Смесь 1 ммоль бромида 9 и 0.2 г (1 ммоль) 3-[2-(4-пиридил)винил]индола перемешивают в 11 мл ацетонитрила при кипячении или в 11 мл диметилформамида при 85°C в атмосфере аргона в течение 12 часов. Затем смесь охлаждают до комнатной температуры, растворитель упаривают при пониженном давлении и сухой остаток хроматографируют на колонке с SiO₂ [хлороформ/метанол (30:1→10:1)] с получением соединения 1. Выход 81%, оранжевый порошок, т.пл. 184 -186°C. [α]_D²³ +21 (с 0.64, CH₃OH). ИК спектр, ν, см⁻¹: 1725 (C=O). 2942 (OH). 3400 (NH). Спектр ЯМР ¹H (500 МГц, MeOD/CDCl₃). δ, м.д. (J, Гц): 0.72, 0.81. 0.92, 0.97. 1.01 (все с. 3Н каждый. H-23-H-27). 1.67 (3Н, с, H-30), 0.58-2.24 (24Н. м, СН, СН₂ в пентациклическом скелете, 4Н, H-2', H-3'), 2.40-2.48 (3Н, м. H-19, H-1'), 3.10-3.15 (1Н, м. H-3), 3.86, 4.33 (2Н. оба д, J=11.0 Гц. H-28), 4.40-4.43 (2Н. м. H-4'), 4.58, 4.69 (2Н, оба уш. с. H-29). 7.12 (1Н, д. J=16.0 Гц, H-10'), 7.26-7.28 (2Н, м. H-16', H-17'), 7.48-7.49 (1Н, м, H-18'), 7.82 (1Н, с, H-12'), 7.89 (2Н, д, J=6.5 Гц, H-6', H-8'), 8.01-8.02 (1Н, м, H-15'), 8.11 (1Н, д, J=16.0 Гц, H-11'), 8.49 (2Н, д, J=6.5 Гц, H-5', H-9'). Спектр ЯМР ¹³C (125 МГц, MeOD/CDCl₃), δ, м. д.: 15.4 (C-27), 16.1 (C-26), 16.6 (C-24), 16.7 (C-25). 19.2 (C-6), 19.5 (C-30), 21.7 (C-11), 22.3 (C-2'), 26.2 (C-12), 27.8 (C-15), 28.0 (C-2), 28.6 (C-23). 30.4 (C-16), 30.6 (C-21). 31.4 (C-3'), 34.1 (C-1'), 35.2 (C-22), 35.4 (C-7), 38.0 (C-10), 38.7 (C-13), 39.7 (C-4), 39.8 (C-1), 41.8 (C-8), 43.6 (C-14), 47.4 (C-17), 48.6 (C-19). 49.7 (C-18), 51.4 (C-9), 56.4 (C-5), 60.4 (C-4'), 63.8 (C-28), 79.4 (C-3), 110.6 (C-29), 113.4 (C-18'), 115.3 (C-13'), 117.3 (C-10'), 121.2 (C-15'), 122.6 (C-17'), 123.0 (C-6', C-8'), 124.3 (C-16'). 126.1 (C-14'), 133.6 (C-12'), 138.8 (C-11'), 139.1 (C-19'), 143.6 (C-5',

30

35

40

45

C-9'), 150.9 (C-20), 156.7 (C-7'), 174.8 (C=O). Найдено, %: С 72.65; Н 8.36. $C_{50}H_{69}BrN_2O_3$. Вычислено, %: С 72.70; Н 8.42. MS: m/z найдено 745.7 [M-Br] (вычислено для $C_{50}H_{69}N_2O_3$ 745.5).

Примеры 2-8 аналогично примеру 1.

Пример 2. N-{8'-[3 β -гидроксиуп-20(29)-ен-28-оил]-3',6'-диоксооктан-1'-ил}-(E)-4-(1H-индол-3-илвинил)пиридиниум бромид (2):

Выход 85%, оранжевый порошок, т. пл. 165 - 167°C. $[\alpha]_D^{23} +1.4$ (с 0.70, CH_3OH). ИК

спектр, ν , cm^{-1} : 1721 (C=O). 2943 (OH), 3402 (NH). Спектр ЯМР 1H (500 МГц, MeOD/ $CDCl_3$), δ , м.д. (J. Гц): 0.71, 0.76, 0.91, 0.92, 0.96 (все с, 3H каждый, H-23-H-27), 1.64 (3H, с, H-30). 0.62-2.19 (24H, м, CH, CH_2 в пентациклическом скелете), 2.91-2.99 (1H, м, H-

19), 3.09-3.12 (1H, м, H-3), 3.62, 3.65 (6H, м, H-2'', H-3'', H-4''), 3.92, 4.22 (4H, both br s, H-1'', H-5''), 4.53-4.57 (3H, м, H-29, H-6''), 4.66 (1H, уш. с, H-29), 7.10 (1H, д, J=16.0 Гц, H-10'), 7.26-7.27 (2H, м, H-16', H-17'), 7.49-7.48 (1H, м, H-18'), 7.81 (1H, с, H-12'), 7.83 (2H, д, J=6.0 Гц, H-6', H-8'), 7.99-8.01 (1H, м, H-15'). 8.09 (1H, д, J=16.0 Гц, H-11'), 8.45 (2H, д,

J=6.0 Гц, H-5', H-9'). Спектр ЯМР ^{13}C (125 МГц, MeOD/ $CDCl_3$), δ , м. д.: 15.2 (C-27), 16.1 (C-26), 16.6 (C-24), 16.7 (C-25), 19.1 (C-6), 19.7 (C-30), 21.7 (C-11), 26.4 (C-12), 27.7 (C-2), 28.5 (C-23), 30.5 (C-15). 31.4 (C-21), 32.9 (C-16), 35.2 (C-7), 37.8 (C-22), 38.0 (C-10), 39.2 (C-13), 39.6 (C-1), 39.7 (C-4), 41.6 (C-8), 43.2 (C-14), 48.0 (C-19), 50.2 (C-18), 51.5 (C-9),

56.4 (C-5), 57.5 (C-17), 60.3 (C-6''), 63.7 (C-1''), 70.1 (C-4'', C-5''), 71.1 (C-3''), 71.4 (C-2''), 79.3 (C-3), 110.4 (C-29), 113.4 (C-18'), 115.3 (C-13'). 117.3 (C-10'), 121.2 (C-15'), 122.5 (C-6', C-8'), 122.6 (C-17'), 124.2 (C-16'), 126.1 (C-14'), 133.5 (C-12'), 138.7 (C-11'), 139.0 (C-19'), 144.1 (C-5', C-9'), 151.2 (C-20), 156.7 (C-7'), 177.3 (C-28). Найдено, %: С 70.15; Н 8.16.

$C_{51}H_{71}BrN_2O_5$. Вычислено, %: С 70.24; Н 8.26. MS: m/z найдено 791.6 [M-Br] (вычислено для $C_{51}H_{71}N_2O_5$ 791.5).

Пример 3. N-{4-[3 β -гидроксиуп-20(29)-ен-28-оил]-бутил}-(E)-4-(1H-индол-3-илвинил)пиридиниум бромид (3):

Выход 84%, оранжевый порошок, т. пл. 217 - 219°C. $[\alpha]_D^{23} +5.6$ (с 0.71, CH_3OH). ИК

спектр, ν , cm^{-1} : 1718 (C=O), 2925 (OH), 3439 (NH). Спектр ЯМР ^1H (500 МГц, MeOD). δ , м.д. (J, Гц): 0.53, 0.73, 0.75, 0.77, 0.96 (все с, 3H каждый, H-23-H-27), 1.69 (3H, с, H-30), 0.58-2.24 (24H, м, CH, CH₂ в пентациклическом скелете, 4H, H-2', H-3'), 2.96-3.05 (2H, м, H-3, H-19), 4.48-4.51 (2H, м, H-4'), 4.61, 4.72 (2H, оба уш. с, H-29), 7.22-7.29 (3H, м, H-10', H-16', H-17'), 7.48-7.49 (1H, м, H-18'), 7.88 (1H, с, H-12'), 8.02 (2H, д, J=6.0 Гц, H-6', H-8'), 8.07-8.09 (1H, м, H-15'), 8.22 (1H, д, J=16.0 Гц, H-11'), 8.58 (2H, д, J=6.0 Гц, H-5', H-9'), 4.30-4.35, 4.04-4.08 (2H, оба м, H-1'). Спектр ЯМР ^{13}C (125 МГц, MeOD), δ , м.д.: 15.2 (C-27), 16.0 (C-26), 16.8 (C-24), 16.9 (C-25), 19.6 (C-6). 19.7 (C-30). 22.2 (C-11), 26.8 (C-12), 26.9 (C-3'), 28.0 (C-2), 28.5 (C-23), 29.5 (C-2'), 30.9 (C-15), 31.8 (C-21), 33.2 (C-16), 35.7 (C-7), 38.1 (C-22), 38.3 (C-10), 39.8 (C-13), 39.9 (C-4), 40.1 (C-1), 42.0 (C-8), 43.6 (C-14), 48.6 (C-19), 50.6 (C-18), 52.0 (C-9), 56.9 (C-5), 57.9 (C-17). 60.6 (C-4'), 64.0 (C-1'), 79.6 (C-3), 110.6 (C-29). 113.6 (C-18'), 115.9 (C-13'), 117.8 (C-10'), 121.7 (C-15'), 122.9 (C-17'), 123.4 (C-6', C-8'), 124.6 (C-16'), 126.6 (C-14'), 133.9 (C-12'), 139.2 (C-11'), 139.6 (C-19'), 144.2 (C-5', C-9'), 151.8 (C-20), 157.4 (C-7'), 177.6 (C-28). Найдено, %: C 72.51; H 8.26. C₄₉H₆₇BrN₂O₃. Вычислено, %: C 72.48; H 8.32. MS: m/z найдено 731.7 [M-Br] (вычислено для C₄₉H₆₇N₂O₃ 731.5).

Пример 4. N-{4-[3 β -ацетоксилуп-20(29)-ен-28-оил]-бутил}-(E)-4-(1H-индол-3-илвинил) пиридиниум бромид (4):

20

25

4

30

35

40

45

Выход 89%, коричневый порошок, т. пл. 149-151°C. $[\alpha]_D^{21}$ -20 (с 0.03, CHCl₃). ИК спектр, ν , cm^{-1} : 1722 (C=O), 3441 (NH). Спектр ЯМР ^1H (500 МГц, MeOD/CDCl₃), δ , м.д. (J, Гц): 0.65, 0.70, 0.75, 0.77, 0.96 (все с, 3H каждый, H-23-H-27), 1.68 (3H, с, H-30), 2.00 (3H, с, CH₃), 0.81-2.23 (24H, м, CH, CH₂ в пентациклическом скелете, 4H, H-2', H-3'), 2.94-2.97 (1H, м, H-19), 4.23-4.30 (1H, м, H-3), 4.44-4.51 (2H, м, H-4'), 4.60, 4.72 (2H, оба уш. с, H-29), 7.16 (1H, д, J=16.0 Гц, H-10'), 7.25-7.23 (2H, м, H-16', H-17'), 7.48-7.49 (1H, м, H-18'), 7.84 (1H, с, H-12'), 7.91-7.98 (2H, м, H-6', H-8'), 8.03-8.04 (1H, м, H-15'), 8.15 (1H, д, J=16.0 Гц, H-11'), 8.51-8.57 (2H, м, H-5', H-9'), 4.33-4.36, 4.07-4.11 (2H, оба м, H-1'). Спектр ЯМР ^{13}C (125 МГц, MeOD/CDCl₃), δ , м.д.: 15.3 (C-27), 16.7 (C-26). 16.9 (C-25, C-24), 19.1 (C-6), 19.7 (C-30), 21.4 (CH₃), 21.9 (C-11). 24.4 (C-12), 26.5 (C-2, C-3'), 28.4 (C-23), 29.2 (C-2'), 30.6 (C-15), 31.5 (C-21), 33.0 (C-16), 35.3 (C-7), 37.9 (C-22), 38.0 (C-10), 38.6 (C-13), 39.3 (C-4), 39.4 (C-1), 41.8 (C-8), 43.4 (C-14), 48.6 (C-19), 50.4 (C-18), 51.5 (C-9). 56.5 (C-5), 57.7 (C-17), 60.3 (C-4'), 63.8 (C-1'), 82.3 (C-3), 110.5 (C-29), 113.5 (C-18'), 115.5 (C-13'), 117.4 (C-10'), 121.4 (C-15'), 122.8 (C-17'), 123.1 (C-6', C-8'), 124.4 (C-16'), 126.3 (C-14'), 133.8 (C-12'), 139.0 (C-11'), 139.2 (C-19'), 143.8 (C-5', C-9'), 151.3 (C-20), 156.9 (C-7'), 172.8 (C=O), 177.4 (C-28). Найдено, %: C 71.67; H 8.11. C₅₁H₆₉BrN₂O₄. Вычислено, %: C 71.73; H 8.14. MS: m/z найдено 773.8 [M-Br] (вычислено для C₅₁H₆₉N₂O₄ 773.5).

Пример 5. N-{4-[3 β -гидроксиурс-12-ен-28-оил]-бутил}-(E)-4-(1H-индол-3-илвинил)

пиридиниум бромид (5):

Выход 83%, темно желтый порошок, т. пл. 194-196°C. $[\alpha]_D^{21} +12.5$ (с 0.04, DMSO).

ИК спектр, ν , cm^{-1} : 1717 (C=O), 2925 (OH), 3442 (NH). Спектр ЯМР ^1H (500 МГц, DMSO), δ , м.д. (J, Гц): 0.54, 0.57, 0.79, 0.80, 0.82, 0.91, 0.99 (все с, 3H каждый, H-23-H-27, H-29, H-30), 0.82-1.95 (22H, м, CH, CH₂ в пентациклическом скелете, 4H, H-2', H-3'), 2.13 (1H, д, J=11.0 Гц, H-18), 2.88-2.91 (1H, м, H-3), 3.93-3.98 (2H, м, H-1'), 4.46-4.49 (2H, м, H-4'), 5.07 (1H, уш. с, H-12), 7.23-7.33 (3H, м, H-16', H-17', H-10'), 7.51-7.53 (1H, м, H-18'), 7.98 (1H, с, H-12'), 8.15-8.19 (3H, м, H-15', H-6', H-8'), 8.30 (1H, д, J=16.0 Гц, H-11'), 8.84 (2H, д, J=6.5 Гц, H-5', H-9'). Спектр ЯМР ^{13}C (125 МГц, DMSO), δ , м.д.: 15.6 (C-25), 16.4 (C-24), 17.2 (C-26), 17.4 (C-29), 18.4 (C-6), 21.4 (C-30), 23.3 (C-2), 23.7 (C-27), 24.2 (C-11), 25.2 (C-16), 27.3 (C-3'), 28.4 (C-15), 28.6 (C-23), 29.5 (C-2'), 30.5 (C-21), 33.1 (C-7), 36.8 (C-10), 36.9 (C-22), 38.6 (C-4), 39.4 (C-1), 40.1 (C-20), 40.4 (C-19), 40.6 (C-8), 42.1 (C-14), 47.3 (C-9), 47.9 (C-17), 52.8 (C-18), 55.2 (C-5), 59.1 (C-4'). 63.6 (C-1'), 77.2 (C-3), 113.1 (C-18'), 114.2 (C-13'), 117.2 (C-10'), 120.9 (C-15'), 121.6 (C-17'), 122.4 (C-6', C-8'), 123.4 (C-16'), 125.3 (C-12, C-14'), 133.0 (C-12'), 137.3 (C-11'), 138.1 (C-13), 138.5 (C-19'), 143.8 (C-5', C-9'), 155.3 (C-7'), 176.8 (C-28). Найдено, %: C 72.31; H 8.28. C₄₉H₆₇BrN₂O₃. Вычислено, %: C 72.28; H 8.32. MS: m/z найдено 731.6 [M-Br] (вычислено для C₄₉H₆₇N₂O₃ 731.5).

Пример 6. N-{4-[3β-ацетоксиурс-12-ен-28-оил]-бутил}-(E)-4-(1H-индол-3-илвинил) пиридиниум бромид (6):

Выход 82%, коричневый порошок, т. пл. 174-176°C. $[\alpha]_D^{21} +9.5$ (с 0.04, CH₃OH). ИК спектр, ν , cm^{-1} : 1719 (C=O), 3440 (NH). Спектр ЯМР ^1H (500 МГц, MeOD), δ , м.д. (J, Гц): 0.59, 0.69, 0.73, 0.76, 0.89, 0.97, 1.06 (все с, 3H каждый, H-23-H-27, H-29, H-30), 1.93 (3H, с, CH₃), 0.82-2.06 (22H, м, CH, CH₂ в пентациклическом скелете, 4H, H-2', H-3'). 2.23 (1H, д, J=11.0 Гц, H-18), 2.25-4.22 (1H, м, H-3), 4.01-4.06 (2H, м, H-1'), 4.47-4.49 (2H, м, H-4'), 5.14 (1H, уш. с, H-12), 7.24 (1H, д, J=16.0 Гц, H-10'), 7.29-7.31 (2H, м, H-16', H-17'), 7.49-7.51 (1H, м, H-18'), 7.89 (1H, с, H-12'), 8.05 (2H, д, J=6.5 Гц, H-6', H-8'), 8.09-8.11 (1H, м, H-15'), 8.23 (1H, д, J=16.0 Гц, H-11'), 8.62 (2H, д, J=6.5 Гц, H-5', H-9'). Спектр ЯМР ^{13}C (125 МГц, DMSO), δ , м.д.: 16.2 (C-25), 17.2 (C-24), 17.8 (C-26), 18.1 (C-29), 19.3 (C-6), 21.3

(C-30), 21.7 (CH₃), 24.2 (C-27), 24.3 (C-11), 24.5 (C-2), 25.4 (C-16), 26.5 (C-3'), 28.6 (C-23), 29.1 (C-15), 30.2 (C-2'), 31.8 (C-21), 34.2 (C-7), 38.0 (C-10), 38.1 (C-22), 38.6 (C-4), 39.3 (C-1), 40.5 (C-19, C-20), 40.9 (C-8), 43.3 (C-14), 48.6 (C-9), 49.3 (C-17), 54.4 (C-18), 56.6 (C-5), 60.8 (C-4'), 65.1 (C-1'), 82.4 (C-3), 113.6 (C-18'), 115.9 (C-13'), 117.9 (C-10'), 121.8 (C-15').

5 122.9 (C-17'), 123.5 (C-6', C-8'), 124.6 (C-16'), 126.7 (C-12, C-14'), 134.1 (C-12'), 139.3 (C-11'), 139.6 (C-13), 140.1 (C-19'), 144.3 (C-5', C-9'), 157.4 (C-7'), 172.9 (COCH₃), 180.5 (C-28).

Найдено, %: C 71.68; H 8.11. C₅₁H₆₉BrN₂O₄. Вычислено, %: C 71.73; H 8.14. MS: m/z найдено 773.6 [M-Br] (вычислено для C₅₁H₆₉N₂O₄ 773.5).

10 Пример 7. N-[4-[3β-гидроксиолеан-12-ен-28-оил]-бутил]-(E)-4-(1H-индол-3-илвинил) пиридиниум бромид (7):

20 Выход 83%, оранжевый порошок, т. пл. 184 - 186°C. [α]_D²¹ +15 (с 0.04, DMSO). ИК

спектр, ν, см⁻¹: 1716 (C=O), 2928 (OH), 3437 (NH). Спектр ЯМР ¹H (500 МГц, DMSO), δ, м.д. (J, Гц): 0.88, 0.52, 0.56, 0.72, 0.78, 0.87, 1.05 (все с, 3H каждый, H-23-H-27, H-29 и H-30), 0.71-2.01 (22H, м, CH, CH₂ в пентациклическом скелете, 4H, H-2', H-3'), 2.75 (1H, д,

25 J=11.0 Гц, H-18). 2.88-2.91 (1H, м, H-3), 3.93-4.04 (2H, м, H-1'), 4.47-4.51 (2H, м, H-4'), 5.11 (1H, уш. с, H-12), 7.21-7.33 (3H, м, H-16', H-17', H-10'), 7.51-7.53 (1H, м, H-18'), 7.98 (1H, с, H-12'), 8.15-8.19 (3H, м, H-15', H-6', H-8'), 8.31 (1H, д, J=16.0 Гц, H-11'), 8.84 (2H, д, J=6.5 Гц, H-5', H-9'). Спектр ЯМР ¹³C (125 МГц, DMSO), δ, м.д.: 15.5 (C-25), 16.4 (C-24).

30 17.2 (C-26). 18.4 (C-6), 23.1 (C-2), 23.3 (C-11), 23.9 (C-27), 25.3 (C-16), 26.1 (C-29), 27.2 (C-3'), 28.3 (C-15), 28.6 (C-23), 29.5 (C-2'), 30.8 (C-20), 32.6 (C-21), 32.8 (C-7), 33.2 (C-30), 33.6 (C-22), 36.9 (C-10), 38.7 (C-4), 39.6 (C-1), 40.2 (C-8), 41.7 (C-18), 42.9 (C-14), 45.8 (C-19), 46.5 (C-17), 47.4 (C-9), 55.2 (C-5), 58.9 (C-4'), 63.6 (C-1'), 77.2 (C-3). 113.1 (C-18'), 114.2 (C-13'), 117.2 (C-10'), 120.9 (C-15'). 121.6 (C-17'), 122.3 (C-12), 122.4 (C-6', C-8'), 123.4 (C-16'), 125.4 (C-14'), 133.1 (C-12'). 137.3 (C-11'), 138.1 (C-19'). 143.7 (C-5', C-9'), 143.9 (C-13), 155.3

35 (C-7'). 177.1 (C-28). Найдено, %: C 72.51; H 8.27. C₄₉H₆₇BrN₂O₃. Вычислено, %: C 72.48; H 8.32. MS: m/z найдено 731.6 [M-Br] (вычислено для C₄₉H₆₇N₂O₃ 731.5).

Пример 8. N-[4-[3β-ацетоксиолеан-12-ен-28-оил]-бутил]-(E)-4-(1H-индол-3-илвинил) пиридиниум бромид (8):

Выход 85%, коричневый порошок, т.пл. 162-164°C. [α]_D²¹ +23.3 (с 0.03, CH₃OH). ИК

спектр, ν , cm^{-1} : 1722 (C=O), 3443 (NH). Спектр ЯМР ^1H (500 МГц, MeOD), δ , м.д. (J, Гц): 0.56, 0.69, 0.72, 0.75, 0.91, 0.95, 1.11 (все с, 3Н каждый, Н-23-Н-27, Н-29 и Н-30), 1.95 (3Н, с, CH_3), 0.71-2.07 (22Н, м, СН, CH_2 в пентациклическом скелете, 4Н, Н-2', Н-3'), 2.86 (1Н, д, J=11.0 Гц, Н-18), 4.02-4.09 (2Н, м, Н-Г). 4.23-4.26 (1Н, м, Н-3). 4.43-4.52 (2Н, м, Н-4'), 5.17 (1Н, уш. с, Н-12), 7.22 (1Н, д, J=16.0 Гц, Н-10'), 7.26-7.31 (2Н, м, Н-16', Н-17'), 7.49-7.51 (1Н, м, Н-18'). 7.89 (1Н, с, Н-12'), 8.02 (2Н, д, J=6.5 Гц, Н-6'. Н-8'). 8.08-8.09 (1Н, м, Н-15'), 8.21 (1Н, д, J=16.0 Гц, Н-11'), 8.60 (2Н, д, J=6.5 Гц, Н-5', Н-9'). Спектр ЯМР ^{13}C (125 МГц, MeOD), δ , м. д.: 16.2 (C-25), 17.2 (C-24), 17.9 (C-26), 19.4 (C-6), 21.3 (CH_3), 24.2 (C-27), 24.2 (C-16), 24.3 (C-11), 24.6 (C-2), 26.5 (C-3'), 26.5 (C-29), 28.6 (C-23), 28.8 (C-15), 30.2 (C-2'). 31.7 (C-20). 33.7 (C-30). 33.8 (C-21). 33.9 (C-7), 34.9 (C-22), 38.1 (C-10). 38.6 (C-4), 39.2 (C-1), 40.7 (C-8), 42.9 (C-14, C-18), 47.1 (C-17). 48.2 (C-9), 48.6 (C-19), 56.6 (C-5), 60.7 (C-4'), 64.9 (C-1'), 82.4 (C-3), 113.6 (C-18'), 115.9 (C-13'), 117.9 (C-10'), 121.7 (C-15'), 122.9 (C-17'), 123.4 (C-6', C-8'), 123.6 (C-12), 124.6 (C-16'), 126.7 (C-14'), 134.1 (C-12'), 139.2 (C-11', C-19'), 144.2 (C-5', C-9'). 145.4 (C-13), 157.3 (C-7'), 172.8 (C=O), 179.4 (C-28).
 Найдено, %: С 71.69; Н 8.11. $\text{C}_{51}\text{H}_{69}\text{BrN}_2\text{O}_4$. Вычислено, %: С 71.73; Н 8.14. MS: m/z найдено 773.6 [M-Br] (вычислено для $\text{C}_{51}\text{H}_{69}\text{N}_2\text{O}_4$ 773.5).

(57) Формула изобретения

1. Конъюгаты бетулина, бетулиновой, урсоловой, олеаноловой кислот с (E)-4-(1H-индол-3-илвинил)-пиридиний бромидом формулы 1-8:

2. Применение конъюгатов тритерпеновых кислот и (E)-4-(1H-индол-3-илвинил)-пиридиний бромида формулы 1-8 по п.1 в качестве противоопухолевых соединений.

40

45